



Вакцинація від РСВ для осіб віком від 60 років: огляд найважливішої інформації



Що таке РСВ?

РСВ — це скорочення від «**р**еспира**т**орно-**с**ин**ц**и**т**іальний **в**ірус». Вірус РСВ уражає дихальні шляхи та насамперед передається повітряно-крапельним шляхом під час кашляння, чхання чи розмови. Також можлива передача через предмети. Як правило, сезон РСВ триває із жовтня по березень. У цей період захворювання, спричинені вірусом, виникають частіше.

РСВ-інфекція зазвичай протікає в легкій формі, а ознаки захворювання схожі на симптоми застуди. Але можливий і важкий перебіг хвороби, що призводить, наприклад, до запалення легенів. РСВ також може погіршити перебіг вже існуючих захворювань, таких як хвороби серця або легенів.

Людей з важким перебігом захворювання іноді доводиться лікувати в лікарні, а іноді — навіть у відділенні інтенсивної терапії. Можливі навіть смертельні випадки.



Кому рекомендується вакцинація від РСВ?

Вакцинація від РСВ рекомендована таким групам людей:

- всі люди **у віці від 75 років**
- особи із певними **важкими попередніми захворюваннями у віці від 60 років**
- особи, які **проживають у закладах догляду, у віці від 60 років**

Ці люди мають підвищений ризик важкого перебігу захворювання. Якщо у людей до 75 років попередні захворювання добре контролюються ліками, рекомендується уточнити у лікаря, чи потрібна вакцинація.

Метою вакцинації від РСВ є зменшення ризику важкого захворювання, якщо людина заразиться вірусом РСВ. Це також має призвести до зменшення кількості госпіталізацій, лікувань у відділеннях інтенсивної терапії та летальних випадків. До того ж стримується поширення хвороби РСВ у закладах догляду.



Які попередні захворювання значно підвищують ризик важко захворіти на РСВ?

Ризик тяжкого захворювання на РСВ може бути підвищеним у випадках важких форм таких попередніх захворювань:

- хронічні захворювання органів дихання,
- хронічні захворювання серцево-судинної системи,
- хронічні захворювання нирок,
- хронічні захворювання нервової системи,
- Diabetes mellitus («цукровий діабет»), а також
- злоякісні захворювання кровотворної системи та
- уроджене чи набуте ослаблення імунної системи (імунодефіцит).



Коли потрібно робити щеплення від РСВ?

Рекомендується зробити щеплення від РСВ **один раз, за можливості до початку сезону РСВ**. Для оптимального захисту рекомендується вакцинація від РСВ **в кінці літа або восени**. Наразі достеменно невідомо, як довго триває вакцинний захист і чи будуть рекомендовані ревакцинації в майбутньому.



Корисно знати:

Щеплення від РСВ можна робити одночасно із щепленням від грипу.



Чи є вакцинація від РСВ безпечною?

Вакцинація від РСВ добре переноситься, є ефективною та безпечною.

Можливі незначні реакції, такі як почервоніння або біль у місці ін'єкції. Важкі побічні дії виникають рідко. Переносимість, ефективність і безпека вакцини постійно досліджуються.

Персональна рекомендація з вакцинавання — у декілька натискань:

Додаткова інформація:



Створено за співпраці з Інститутом Роберта Коха. Більше інформації про РСВ та про те, як ви можете захистити себе, можна знайти за посиланнями: www.infektionsschutz.de, www.impfen-info.de або www.rki.de/rsv.