

Impfkalender 2017/2018 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2017

Säuglinge und Kleinkinder
(2 – 23 Monate)

Kinder und Jugendliche
(2 – 17 Jahre)

Erwachsene
(ab 18 Jahre)

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)					Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)				Erwachsene (ab 18 Jahre)		
	6 Wochen	2 Monate	3 Monate	4 Monate	11–14 Monate	15–23 Monate	2–4 Jahre	5–6 Jahre	9–14 Jahre	15–17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Tetanus >		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2			A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie >		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2			A (alle 10 Jahre)	
Keuchhusten (Pertussis) >		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2			A ^d	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b) >		G1	G2	G3	G4	N						
Kinderlähmung (Poliomyelitis) >		G1	G2	G3	G4	N			A		ggf. N	
Hepatitis B >		G1	G2	G3	G4	N						
Pneumokokken >		G1 ^b		G2	G3	N						S ^f
Rotaviren >	G1 ^a	G2	(G3)									
Meningokokken C >					G (ab 12 Monaten)		N					
Masern >					G1	G2	N				S ^e	
Mumps >					3-fach- Impfung MMR	3-fach- Impfung MMR + Windpocken	N					
Röteln >							N					
Windpocken (Varizellen) >					G1	G2	N					
Gebärmutterhalskrebs (HPV) >									♀ G1+G2 ^c	♀ N ^c		
Grippe (Influenza) >					Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere						S (jährlich)	

Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder

Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche

Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1–G4)

Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)

Standardimpfung

Auffrischimpfung

Impfpfehlungen für Mädchen und junge Frauen

^a die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen

^b Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)

^c je nach Impfstoff 2 Impfungen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren, bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter >13 bzw. 14 Jahren 3 Impfungen

^d einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis
^e Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Immunschutz

^f Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff