

# Impfkalender 2019/2020 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2019



**impfen-info.de**  
Wissen, was schützt.

Säuglinge und Kleinkinder  
(2 – 23 Monate)

Kinder und Jugendliche  
(2 – 17 Jahre)

Erwachsene  
(ab 18 Jahre)

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)					Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)					Erwachsene (ab 18 Jahre)		
	6 Wochen	2 Monate	U4 3 Monate	4 Monate	U6 11–14 Monate	U7 15–23 Monate	2–4 Jahre	U9 5–6 Jahre	J1 9–14 Jahre	15–16 Jahre	17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Rotaviren	G1 <sup>a</sup>	G2	(G3)										
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2		N		A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2		N		A (alle 10 Jahre)	
Keuchhusten (Pertussis)		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2		N		A <sup>d</sup>	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)		G1	G2	G3	G4	N							
Kinderlähmung (Poliomyelitis)		G1	G2	G3	G4	N		A		N		ggf. N	
Hepatitis B						N							
Pneumokokken		G1 <sup>b</sup>		G2	G3	N							S <sup>f</sup>
Meningokokken C					G (ab 12 Monaten)		N						
Masern					G1	G2	N					S <sup>e</sup>	
Mumps					G1	G2	N						
Röteln					G1	G2	N						
Windpocken (Varizellen)					G1	G2	N						
HPV (Humane Papillomviren)								G1+G2 <sup>c</sup>	N <sup>c</sup>				
Gürtelrose (Herpes zoster)													G1+G2 <sup>h</sup>
Grippe (Influenza)							Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere					S (jährlich)	

**U** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder

**J** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche

**G** Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1–G4)

**N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)

**S** Standardimpfung

**A** Auffrischimpfung

**a** die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen

**b** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)

**c** 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9 - 14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter > 14 Jahre sind 3 Impfungen erforderlich

**d** einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis

**e** Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit

**f** Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff

**h** Zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten.